



Twój najlepszy przyjaciel zasługuje na najlepszą opiekę.

Jeśli Twój pies jest narażony na ryzyko zachorowania na nowotwór, bardzo ważne są coroczne badania przesiewowe w kierunku chłoniaka.

Nowotwory są główną przyczyną śmierci dorosłych psów. Chłoniak to jeden z najczęstszych nowotworów.¹ Jeśli więc Twój pies jest obciążony podwyższonym ryzykiem* zachorowania na nowotwór, w tym na chłoniaka, ważne jest, aby zachować czujność i poddawać go corocznym badaniom przesiewowym. Jeśli wykryjemy nowotwór wcześnie, możemy z nim szybciej i skuteczniej walczyć.

Wszystkie psy



Rasy wysokiego ryzyka



W poszukiwaniu chłoniaka.

Chłoniak, wywodzący się z układu limfatycznego, jest jednym z najczęściej występujących rodzajów nowotworów u psów. Symptomy mogą być bardzo różne. U niektórych psów objawy kliniczne nie występują w ogóle, natomiast u innych może wystąpić utrata masy ciała, wymioty, biegunka, pojawienie się nowych guzów na ciele lub trudności w oddychaniu. U psów chłoniak może rozwijać się szybko, często nie dając żadnych widocznych objawów aż do momentu, kiedy jest już za późno, dlatego tak ważne są regularne badania w kierunku chłoniaka. Regularne badania przesiewowe to większa szansa na wcześniejsze wykrycie chłoniaka.

Proste badanie krwi o niezwykłych możliwościach.

W diagnostyce onkologicznej zaszły ogromne zmiany. Na podstawie wstępnych danych test IDEXX Cancer Dx™ może wykryć chłoniaka z pojedynczej próbki krwi, nawet u psów bezobjawowych². Jeśli więc Twój pies jest obciążony ryzykiem zachorowania, porozmawiaj z lekarzem weterynarii o regularnych badaniach przesiewowych.

Zdrowie zaczyna się od dobrego planu.

Jak dowiedzieć się, czy u Twój pies jest zagrożony zachorowaniem na nowotwór? Kiedy Twój pies skończy 7 lat, regularne badania przesiewowe staną się elementem niezbędnym dla zachowania jego zdrowia. Niemniej w przypadku niektórych ras badania należy rozpocząć już u psów w wieku 4 lat. Porozmawiaj z lekarzem weterynarii, aby określić ryzyko wystąpienia nowotworu u Twojego psa. Pozwoli to opracować plan opieki zdrowotnej dostosowany do jego potrzeb.

Następujące rasy są bardziej narażone na zachorowanie na raka:

Golden retriever	Terier szkocki
Bulldog francuski	Bullmastif
Beagle	Labrador retriever
Bokser	Rottweiler
Sznaucer miniaturowy	Doberman pinczer
Berneński pies pasterski	Bulldog angielski
Flat-coated retriever	

Nowotwór? W tym przypadku „negatywny” znaczy „zdrowy”.

Podobnie jak ludzie, psy zagrożone zachorowaniem na nowotwór powinny regularnie przechodzić badania przesiewowe. Chociaż większość testów nie wykaże obecności chłoniaka, najlepszym sposobem na wczesne wykrycie tego nowotworu są regularne badania przesiewowe. Wynik, który nie wskazuje na chłoniaka, nie gwarantuje, że u Twojego psa w przyszłości nie rozwinie się chłoniak lub inny rodzaj nowotworu.

Czego można oczekiwać, jeśli wynik jest pozytywny?

Jeśli wyniki badań Twojego psa wskazują na chłoniaka, lekarz weterynarii może zalecić ponowne badanie za 4–8 tygodni albo inne dodatkowe badania, w zależności od objawów. W potwierdzonych przypadkach chłoniaka dalsze działania mogą obejmować skierowanie do specjalisty lub omówienie takich opcji leczenia jak chemioterapia, radioterapia, zabieg chirurgiczny lub leczenie paliatywne. Wiele psów dobrze znosi chemioterapię, co pozwala im zachować dobrą jakość życia w trakcie leczenia^{3,4}. Regularne badania przesiewowe mają kluczowe znaczenie w zapewnianiu szybkiej i właściwej opieki.

Najlepszy prezent, jaki możesz dać swojemu psu? Długo i zdrowe życie.

Badania przesiewowe w kierunku nowotworów to jedynie niewielka część planu opieki zdrowotnej nad psem. Oprócz diety, aktywności fizycznej, regularnych badań i kochającej rodziny Ty i Twój lekarz weterynarii możecie pomóc Twojemu psu żyć długo i cieszyć się dobrym zdrowiem.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Odwiedź stronę wearethecure.org i fetchacure.org.

Porozmawiaj z lekarzem weterynarii na temat badań przesiewowych w kierunku chłoniaka.

IDEXX

IDEXX Laboratories, Inc.
One IDEXX Drive
Westbrook, Maine 04092
USA

* Do grupy ryzyka zalicza się wszystkie psy w wieku ≥ 7 lat oraz rasy wysokiego ryzyka w wieku ≥ 4 lat.

Bibliografia

1. Jakieką są najczęstsze rodzaje nowotworów u psów? Ile psów statystycznie zapada na raka? Veterinary Cancer Society; 2021. Dostęp: 3 lutego 2025 r., www.vetcancersociety.org/pet-owners/faqs
2. Dane z badań własnych w IDEXX Laboratories, Inc. Westbrook, Maine, USA: Dane oparte na testach przeprowadzonych w laboratoriach referencyjnych IDEXX w Ameryce Północnej w okresie od 1 listopada 2024 r. do 6 grudnia 2024 r. Raport analityczny: IDEXX Cancer Dx Validation, 100282 [008_CancerDx-Validation-Report-2.Rmd].
3. Bergmann M, Sauter-Louis C, Hirschberger J. Lebensqualität und Lebenserwartung am malignen Lymphom erkrankter Hunde unter Chemotherapie. Eine Besitzerumfrage [Quality of life and life expectancy of dogs undergoing chemotherapy for malignant lymphoma. An owner survey]. *Tierarztl Prax Ausg K Kleintiere Heimtiere*. 2011;39(4):229–236.
4. Bianchi ML, Drudi D, Treggiari E, et al. Quality of life assessment in cancer patients receiving single-agent versus multidrug chemotherapy protocols. *Open Vet J*. 2021;11(4):755–763. doi:10.5455/OVJ.2021.v11.i4.28

© 2026 IDEXX Laboratories, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. • 09-2692504-00

Wszystkie znaki ®/TM są własnością IDEXX Laboratories, Inc. lub jednostek z nią stowarzyszonych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Polityka prywatności firmy IDEXX jest dostępna na stronie idexx.com.

